



수두 예방접종

수두와 이를 예방하는데 사용되는 수두 예방접종의 효과 및 접종 방법에 대한 안내문입니다.

1. 수두란?

- 수두는 소아기에 흔한 발진성 질환 중의 하나로, 수두 바이러스 감염에 의하여 발생합니다.
- 가려움증을 동반하는 수포성 발진이 머리, 얼굴, 몸통 및 사지에 퍼지는 양상으로 나타나고 간혹 발열과 피로 등의 증상이 동반되기도 합니다.
- 수두를 앓은 후 통증을 동반하는 대상포진이 나타날 수 있습니다.

2. 수두의 전파경로

- 수두 바이러스는 호흡기 분비물 등의 비말을 통해 호흡기로 감염되거나 피부 병변 수포액에 직접 접촉함으로써 사람에서 사람으로 전염될 수 있습니다.

3. 수두 예방법은?

- 수두 예방접종을 통해 예방할 수 있습니다.

- **접종대상 : 모든 영·유아**
- **권장 접종시기 : 생후 12~15개월에 1회 접종**

4. 수두 예방접종의 효과는?

- 수두 예방접종을 받은 대부분의(70~90%) 사람은 수두에 걸리지 않으며, 심한 수두에 대한 예방효과는 90% 이상입니다.
- 수두 백신을 접종받은 후에도 수두에 걸리는 경우가 있는데 대개 가벼운 증상으로 나타나고, 발진의 숫자도 적고 열이 날 가능성도 적으며 회복도 빨리 됩니다.

5. 수두 예방접종의 안전성

- 다른 의약품들과 마찬가지로 수두 백신도 심한 알레르기 반응과 같은 이상반응을 일으킬 수도 있지만 매우 드물며, 안전한 백신으로 알려져 있습니다.

6. 수두 예방접종 시 주의할 사항은?

- 건강한 상태에서 수두 백신을 접종받는 것이 중요하며, 접종 전 반드시 의사의 예진을 받아야 합니다.
- 다음과 같은 경우는 예방접종을 받아서는 안됩니다.
 - 수두백신에 포함된 성분(예: 젤라틴, 네오마이신 등)에 아나필락시스 반응 등의 심한 알레르기 반응을 보인 경우
 - 임신, 면역기능 이상 또는 중등도 이상의 급성 질환
 - 아스피린을 복용하고 있는 경우
 - 면역글로불린, 수혈 등 항체 함유 혈액제제 투여 후 일정기간 이내

7. 예방접종 후 주의사항

- 접종 후 20~30분간 접종기관에 머물러 관찰합니다.
- 귀가 후 적어도 3시간 이상 주의 깊게 관찰합니다.
- 접종부위는 청결히 합니다.
- 접종 후 최소 3일간은 특별한 관심을 가지고 관찰하며, 고열이 있거나 평소와 다른 신체증상이 나타나면 곧 의사의 진료를 받도록 합니다.

8. 수두 예방접종 후 발생 가능한 이상반응은?

- 국소 이상반응
 - 발적, 접종부위의 통증이나 부어오름, 주사부위의 염증 등
- 전신 이상반응
 - 발열, 대상포진, 수포성 발진 등

9. 수두 예방접종 후 이상반응이 생기면?


- 이상반응이 나타나면 즉시 의료기관을 방문해야 합니다.
- 이때 의사에게 이상반응 증상, 증상이 발현한 시간 및 예방접종 시간 등을 알려주어야 합니다.
- 또한 관할 보건소에 신고하거나 예방접종도우미사이트 (<http://nip.cdc.go.kr>)의 「이상반응 신고하기」를 통해 신고합니다.



10. 예방접종피해 국가보상제도 안내

- 정부는 1995년부터 국가필수예방접종 후 발생한 이상반응으로 진료비가 30만원 이상일 경우 진료비 보상과 장애나 사망에 대한 일시보상금을 지급하는『예방접종피해 국가보상제도』를 운영하고 있습니다.

※ 자세한 사항은 접종받은 기관이나 보건소에 문의하시거나, 예방접종도우미사이트(<http://nip.cdc.go.kr>)를 방문하시기 바랍니다.



접종기관명:

연락처:

